

Probabilistic graphical models: Assignment 2

Seung-Hoon Na

May 13, 2017

1 Exponential family

$\mathcal{X}$ 를 주어진 변수 집합이라고 하자. Exponential family $\mathcal{P}$ 는 다음과 같이 $(\tau, \Theta, \mathbf{t}, A)$ 로 정의된다:

- $\tau (\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{R}^K)$: sufficient statistics function (일종의 feature vectors)
- $\Theta \in \mathcal{R}^M$: Parameter space (convex set)
- $\mathbf{t} (\mathcal{R}^M \rightarrow \mathcal{R}^K)$: Natural parameter function
- A : Auxiliary measure over $\mathcal{X}$

$$P_{\boldsymbol{\theta}}(\xi) = \frac{1}{Z(\boldsymbol{\theta})} A(\xi) \exp \{ \langle \mathbf{t}(\boldsymbol{\theta}), \tau(\xi) \rangle \} \quad (1)$$

Linear exponential family는 $\mathbf{t}$ 가 identity function인 특수한 exponential family로 Eq. (1)는 다음과 같이 단순화된다.

$$P_{\boldsymbol{\theta}}(\xi) = \frac{1}{Z(\boldsymbol{\theta})} \exp \{ \langle \boldsymbol{\theta}, \tau(\xi) \rangle \} \quad (2)$$

이때, $\boldsymbol{\theta}$ 를 natural parameter라고 한다.

1.1 Linear exponential family for Gaussian distribution

mean이 μ , variance가 σ^2 인 Univariate Gaussian distribution를 linear exponential family형태로 기술하시오.

1.2 Linear exponential family for Bernoulli distribution

이진 출력 $x^{(0)}, x^{(1)}$ 에 대한 Bernoulli distribution에서 θ 가 $x^{(1)}$ 이 발생할 확률이라고 할때, Bernoulli distribution을 위한 $P(X = x^{(1)})$ 를 Linear exponential family의 형식으로 기술하고, natural parameter를 θ 의 함수로 나타내시오.

1.3 Linear exponential family for Multinomial distribution

X 를 k 개의 출력 $x^{(1)}, \dots, x^{(k)}$ 중 하나를 취하는 multinomial random variable이라고 하자. $\theta^{(k)}$ 를 $x^{(k)}$ 가 발생할 확률이라고 할 때, multinomial distribution을 위한 $P(X = x^{(k)})$ Linear exponential family의 형식으로 기술하고, natural parameter를 $\theta^{(1)}, \dots, \theta^{(k)}$ 의 함수 벡터로 표현하시오.

1.4 Entropy of exponential family

P_{θ} 를 sufficient statistics function τ , Natural parameter function $\mathbf{t}$ 로 정의되는 exponential family라고 할때, 다음의 엔트로피 식을 유도하시오.

$$\mathbf{H}_{P_{\theta}}(\mathcal{X}) = \ln Z(\theta) - \langle \mathbf{E}_{P_{\theta}}[\tau(\mathcal{X})], \mathbf{t}(\theta) \rangle \quad (3)$$

1.5 Entropy of Gaussian distribution

위 문제의 exponential family에 대한 일반화된 entropy 공식을 이용하여, univariate Gaussian distribution의 entropy를 유도하시오.

2 Mean field approximation

주어진 Markov network $\mathcal{G}$ 에 대한 확률 분포 P_{Φ} 이 다음과 같이 factorization된다고 하자.

$$P_{\Phi}(\mathcal{X}) = \frac{1}{Z} \tilde{P}_{\Phi}(\mathcal{X}) = \frac{1}{Z} \prod_{\phi \in \Phi} \phi(U_{\phi}) \quad (4)$$

여기서 U_{ϕ} 은 $\text{Scope}[\phi] \in \mathcal{X}$ 이다.

확률 분포 P_1 과 P_2 간의 Relative entropy는 다음과 같이 정의된다.

$$\mathbf{D}(P_1 \| P_2) = \mathbf{E}_{P_1} \left[\ln \frac{P_1(\mathcal{X})}{P_2(\mathcal{X})} \right] \quad (5)$$

P_{Φ} 의 I-projection은 $\mathbf{D}(Q \| P_{\Phi})$ 가 최대가 되는 확률 분포 Q 이다 ($Q \in \mathcal{P}_{restricted}$).

2.1 Energy functional

P_{Φ} 에 대한 Q 의 Energy functional를 다음과 같이 정의하자.

$$F[\tilde{P}_{\Phi}, Q] = \mathbf{D}(Q \| P_{\Phi}) - \ln Z \quad (6)$$

$\ln Z$ 는 Q 에 독립적인 상수이므로, $\mathbf{D}(Q \| P_{\Phi})$ 를 최소화 하는 것은 $F[\tilde{P}_{\Phi}, Q]$ 를 최대화하는 것과 등가가 된다.

위의 정의 Eq. (6)에 따라, Energy functional에 대한 다음의 식을 유도하시오.

$$\begin{aligned} F[\tilde{P}_{\Phi}, Q] &= \mathbf{E}_Q \left[\ln \tilde{P}_{\Phi}(\mathcal{X}) \right] + \mathbf{H}_Q(\mathcal{X}) \\ &= \sum_{\phi \in \Phi} \mathbf{E}_Q [\ln \phi] + \mathbf{H}_Q(\mathcal{X}) \end{aligned} \quad (7)$$

2.2 Energy functional on Mean field energy

Mean field approximation을 위해 분포 Q 를 다음과 같이 marginals들의 곱으로 factorization된다고 가정한다.

$$Q(\mathcal{X}) = \prod_i Q(X_i) \quad (8)$$

여기서 $\sum_{x_i} Q(x_i) = 1$ 이다. (clarity를 위해 $Q(X_i)$ 는 $Q_i(X_i)$ 으로 가정해도 된다)

위의 setting에서 P_Φ 에 대한 Q 의 Energy functional이 다음이 됨을 유도하시오.

$$F[\tilde{P}_\Phi, Q] = \sum_{\phi \in \Phi} \mathbf{E}_{U_\phi \sim Q} [\ln \phi] + \sum_i \mathbf{H}_Q(X_i) \quad (9)$$

이때 U_ϕ 는 potential function ϕ 의 scope에 해당되는 랜덤 변수들의 집합이다.

추가로, 유도과정에서 위의 식에서 사용된 $\mathbf{E}_{U_\phi \sim Q} [\ln \phi]$ 의 정의를 명확하게 기술하시오 ($U_\phi \sim Q$ 의 의미를 명확히 파악하라).

2.3 Lemma for maximizing energy functional on Mean field energy

$Q(\mathcal{X}) = \prod_i Q(X_i)$ 일때, 다음의 식이 성립함을 보여시오.

$$\frac{\partial}{\partial Q(x_i)} \mathbf{E}_{U_\phi \sim Q} [f(U)] = \mathbf{E}_{U_\phi \sim Q} [f(U)|x_i] \quad (10)$$

이때, 유도과정에서 $\mathbf{E}_{U_\phi \sim Q} [f(U)|x_i]$ 가 명확히 정의되어야 한다.

2.4 Maximizing energy functional on Mean field energy

Lagrangian method를 이용하여 Eq. 9의 local maximum에서 $Q(x_i)$ 의 조건이 다음이 됨을 유도하시오.

$$Q(x_i) = \frac{1}{Z_i} \exp \left\{ \sum_{\phi \in \Phi} \mathbf{E}_{\mathcal{X} \sim Q} [\ln \phi | x_i] \right\} \quad (11)$$

마찬가지로, 유도과정에서 위의 식의 $\mathbf{E}_{\mathcal{X} \sim Q} [\ln \phi | x_i]$ 이 명확히 정의되어야 한다.

2.5 Maximizing energy functional on Mean field energy: Mean field algorithm

위의 식을 더 전개하여 $Q(x_i)$ 의 local optimal 조건이 다음이 됨을 보이시오.

$$Q(x_i) = \frac{1}{Z_i} \exp \left\{ \sum_{\phi: X_i \in \text{Scope}[\phi]} \mathbf{E}_{U_\phi - \{X_i\} \sim Q} [\ln \phi(U_\phi - \{X_i\}, X_i = x_i)] \right\} \quad (12)$$

여기서, $\phi(U_\phi - \{X_i\}, X_i = x_i)$ 는 변수 X_i 의 값이 x_i 로 고정되고, scope $U_\phi - \{X_i\}$ 인 ϕ 로부터 파생된 function이다. 예를 들어, 두 개의 variables로 구성된 potential function $\phi(X_1, X_2)$ 에 대해서 $\phi(U_\phi - \{X_2\}, X_2 = x_2)$ 는 다음과 같다.

$$\phi(U_\phi - \{X_2\}, X_2 = x_2) = \phi(X_1, X_2 = x_2) \quad (13)$$

(참고로, $U_\phi = \{X_1, X_2\}$)




Figure 1: $\mathcal{G}$: A simple graphical model

2.6 Example: Mean field algorithm

그림 1과 같이 변수 A, B 에 대한 두 개의 노드로 구성된 단순한 Undirected graphical model $\mathcal{G}$ 가 주어졌다고 가정하자. $\mathcal{G}$ 에 대한 확률 분포 P_{Φ} 는 다음과 같이 factorization 된다.

$$P_{\Phi}(a, b) = \frac{1}{Z} \phi_{A,B}(a, b) \phi_A(a) \phi_B(b) \quad (14)$$

위의 확률 분포에 대한 Mean field approximation을 위해 $Q(a, b) = Q_A(a)Q_B(b)$ 라고 놓고, 앞의 문제들의 결과를 이용하여 $Q_A(a)$ 와 $Q_B(b)$ 에 대한 fixed-point algorithm을 위한 local optimal 조건식을 유도하라.

이렇게 구한 조건식을 이용한 mean field approximation algorithm의 기술하시오 (구현을 위한 pseudo code의 핵심 절차를 기술할 것 - 초기화 및 update과정).